


RISK INFORMATION:

Consult a health care practitioner prior to use if you have overactive bladder syndrome (detrusor instability), a seizure disorder, or a kidney disease/disorder, or liver disease or if you have been instructed to follow a low protein diet. Consult a health care practitioner prior to use if you are following a diet rich in nitrates (e.g. plants from the Amaranthaceae family such as beets, spinach, etc.), or if you have diabetes, prostate disorder or are taking any prescription medication. Consumption with caffeine-containing products (e.g. medications, coffee, tea, cola, guarana, mate) is not recommended as it may increase the risk of adverse effects. Caffeine has been shown to reduce blood flow to the heart muscle during exercise which might lead to cardiovascular complications such as chest pain, and irregular heartbeat even in healthy individuals. If those symptoms occur, stop use and consult a health care practitioner. Consult a health care practitioner if you are of childbearing age, pregnant, or breastfeeding. This product is not intended as a substitute for sleep. Discontinue use if you experience nausea, loss of appetite, dizziness, insomnia, hyperactivity/anxiety or increased sweating. May result in weight gain. If the following symptoms appear: weakness, confusion, headache, difficulty breathing, and/or pale, gray, or blue coloured skin, stop use and consult a health care practitioner. These symptoms may be signs of methemoglobinemia, a rare disorder, which may appear up to 2 hours after use. Reduce the dose if flushing, tingling and/or pricking sensation of the skin occurs. Stop use if hypersensitivity/allergy occurs. Do not use if you have cardiovascular disease risk factors (e.g. high blood pressure, high cholesterol and/or triglycerides, obesity) or glaucoma. Do not take if you are taking decongestant-containing cold preparations (i.e. phenylephrine or pseudoephedrine), products containing ephedra/ephedrine, or other medications which increase blood pressure.

Consultez un professionnel de la santé avant l'utilisation si vous souffrez du syndrome de la vessie hyperactive (instabilité du détusor), d'un trouble épileptique, d'une maladie ou d'un trouble rénal, d'une maladie du foie ou si on vous a conseillé de suivre un régime alimentaire à faible teneur en protéines. Consultez un professionnel de la santé avant toute utilisation si vous suivez un régime alimentaire riche en nitrates (par exemple, des plantes de la famille des amarantacées telles que les betteraves, les épinards, etc.), ou si vous souffrez de diabète, de troubles de la prostate ou si vous prenez des médicaments sur ordonnance. La consommation de produits contenant de la caféine (par exemple, médicaments, café, thé, cola, guarana, maté) n'est pas recommandée car elle peut augmenter le risque d'effets indésirables. Il a été démontré que la caféine réduit le flux sanguin vers le muscle cardiaque pendant l'exercice, ce qui peut entraîner des complications cardiovasculaires telles que des douleurs thoraciques et des battements cardiaques irréguliers, même chez les personnes en bonne santé. Cessez l'utilisation et consultez un professionnel de la santé si ces symptômes apparaissent. Consultez un professionnel de la santé si vous êtes en âge de procréer, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Ce produit n'est pas destiné à remplacer le sommeil. Cessez l'utilisation en cas de nausées, de perte d'appétit, de vertiges, d'insomnie, d'hyperactivité/anxiété ou d'augmentation de la transpiration. Peut entraîner une prise de poids. Cessez l'utilisation et consultez un professionnel de la santé si les symptômes suivants apparaissent: faiblesse, confusion, maux de tête, difficulté à respirer ou peau de couleur pâle, grise ou bleue. Ces symptômes peuvent être des signes de méthémoglobinémie, une maladie rare qui peut apparaître jusqu'à deux heures après l'utilisation. Réduire la dose en cas de rougeurs, de picotements ou de sensations de fourmillement de la peau. Arrêtez l'utilisation en cas d'hypersensibilité ou d'allergie. Ne pas utiliser si vous présentez des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires (par exemple, hypertension, taux élevé de cholestérol et/ou de triglycérides, obésité) ou de glaucome. Ne pas consommer si vous prenez des préparations pour le rhume contenant des décongestionnants (par exemple, de la phényléphrine ou de la pseudoéphédrine), des produits contenant de l'éphédra/éphédrine ou d'autres médicaments qui augmentent la pression sanguine.



MEDICINAL INGREDIENTS/INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
SERVING SIZE: 1 SCOOP (18.5 g) / TAILLE DE LA PORTION: 1 CUILLÈRE (18,5 g)
SERVINGS PER CONTAINER: 20 / PORTIONS PAR CONTENANT: 20

| Each scoop (18.5 g) contains: | Daily Dose (1 Scoop) |
|--|----------------------|
| L-Citrulline | 4000mg |
| L-Citrulline (Citrulline Malate) | 550mg |
| NitralMax (NO3-C) [™] L-Citrulline (Citrulline Nitrate) | 700mg |
| CarnoSyn [®] Beta-Alanine | 3200mg |
| Creatine Hydrochloride | 1000mg |
| Creatine Monohydrate | 3000mg |
| Taurine | 1000mg |
| N-Acetyl-L-Tyrosine | 400mg |
| Caffeine Anhydrous | 300mg |
| Theacrine (TeaCrine [®]) | 62.5mg |
| AlphaSize [®] Choline alfoscerate (L-Alpha-Glycerophosphorylcholine) | 100mg |
| Advantira Z [®] Bitter Orange fruit Extract (<i>Citrus aurantium</i>) | 80mg |
| (standardized for 50% p-synephrine) | |
| Toothed club-moss aerial parts extract (<i>Huperzia serrata</i>) | 5mg |
| (standardized for 1% Huperzine A) | |

| Chaque cuillerée (18,5 g) contient : | Dose quotidienne (1 cuillerée) |
|--|--------------------------------|
| L-Citrulline | 4000 mg |
| L-Citrulline (malate de citrulline) | 550 mg |
| NitralMax (NO3-C) [™] L-Citrulline (nitrate de citrulline) | 700 mg |
| CarnoSyn [®] Béta-alanine | 3200 mg |
| Chlorhydrate de créatine | 1000 mg |
| Monohydrate de créatine | 3000 mg |
| Taurine | 1000 mg |
| N-acétyl-L-tyrosine | 400 mg |
| Caféine anhydre | 300 mg |
| Theacrine (TeaCrine [®]) | 62,5 mg |
| AlphaSize [®] Alfoscérate de choline (L-alpha-glycérophosphorylcholine) | 100 mg |
| Advantira Z [®] Extrait d'orange amère (<i>Citrus aurantium</i>) | 80 mg |
| (normalisé à 50 % de p-synéphrine) | |
| Extrait de parties aériennes de lycopode denté (<i>Huperzia serrata</i>) | 5 mg |
| (normalisé à 1 % d'huperzine A) | |

Non-Medicinal Ingredients: Calcium Silicate, Natural Flavors, Silicon Dioxide, Citric Acid, Sucralose, Acesulfame Potassium, DL-Malic Acid, Beta-Carotene, Vegetable Juice Powder.

Ingrédients non médicinaux: Silicate de calcium, Arômes naturels, Dioxyde de silicium, Acide citrique, Sucralose, Acesulfame-K, Acide DL-malique, bêta-carotène, Poudre de légumes.

Cellucor[®], C4 Ultimate[®], Project Clear Evolution[™], and the  logo are trademarks of and distributed by: Nutrabolt[®]
Imported and Distributed by / Importé et distribué par: Nutrabolt Distribution Canada ULC, 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400, Mississauga, Ontario, L5B 3C3 1.866.611.2348 - www.cellucor.ca

[#]Based on cumulative sales of all C4[®] branded products from 2010 to the present.

[#]Basé sur les ventes cumulées de tous les produits de la marque C4[®] de 2010 à aujourd'hui.

* Improves performance in repetitive bouts of brief, highly intense physical activity.

* Améliore les performances lors de périodes répétitives d'activité physique brève et très intense.

For complete patent and trademark information, visit <https://cellucor.ca/products/c4-ultimate>

Pour obtenir des renseignements complets sur les brevets et les marques de commerce, visitez <https://cellucor.ca/products/c4-ultimate>

TEACRINE AlphaSize[®]
CarnoSyn[®] CON-CRÈT[®] REINFORCED[®] ADVANTIRA Z[®]

C4 ULTIMATE[®] PERFORMANCE ID[®]

5.25G
TRI-SOURCE
L-CITRULLINE

3.2G
CARNO SYN[®]
BETA-ALANINE

4G
DUAL-SOURCE
CREATINE

300MG
CAFFEINE

C4[®]

ULTIMATE[®]

ULTIMATE PRE-WORKOUT PERFORMANCE[®]
PERFORMANCE ULTIME AVANT L'ENTRAÎNEMENT[®]

#1 AMERICA'S
BEST-SELLING
PRE-WORKOUT BRAND!
LA MARQUE DU PRÉ-ENTRAÎNEMENT LA PLUS VENDUE EN AMÉRIQUE DU NORD[#]

PROJECT
CLEAR
EVOLUTION[™]


CLEAN
NO ARTIFICIAL FLAVORS.


CLEAR
TRANSPARENT LABEL DESIGN.


EVOLVED
INNOVATIVE INGREDIENTS.
ENHANCED FORMULAS.

SUGGESTED USE:

Adults (75 kg or greater), take 1 scoop daily or as directed by a health care practitioner. Mix product well in 10-12 fl. oz. (296 - 355 ml) of water immediately before consumption. Ensure to drink enough fluid before, during, and after exercise. Consult a health care practitioner for use beyond 4 weeks. Not for prolonged use.

Adultes (75 kg ou plus), prendre une (1) cuillerée par jour ou selon les directives d'un professionnel de la santé. Bien mélanger le produit dans 296-355 ml (10-12 oz. liq.) d'eau immédiatement avant la consommation. Assurez-vous de boire suffisamment avant, pendant et après l'exercice. Consultez un professionnel de la santé pour toute utilisation au-delà de quatre semaines. Non destiné à un usage prolongé.

FOLLOW @CELLUCOR   
FOR GIVEAWAYS AND UPDATES

110122



PEEL HERE FOR ADDITIONAL INFORMATION
DÉCOLLER ICI POUR PLUS D'INFORMATION

20 ORANGE MANGO
SERVINGS PORTIONS
WORKOUT SUPPLEMENT/SUPPLÉMENT D'ENTRAÎNEMENT
NPN: 80096480 NET WT. 370 g (POWDER/POUDRE)

PROJECT
CLEAR
EVOLUTION[™]
CLEAN.
CLEAR. EVOLVED.